AVERTISSEMENTS AGRICOLES®
POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES
REGION CENTRE
www.srpv-centre.com

Vigne n° 14 - 05/07/2006 (3 pages)

Avertissements Agricoles Vigne

Black-rot
Dans les parcelles concernées, utiliser un anti-mildiou approprié

Botrytis
Intervention au stade B

Mildiou
Maintenir une protection correcte

Oïdium
Maintenir la protection jusqu'au stade 33

Acariens
Peu présents ; à surveiller

Cicadelle verte
A surveiller

Tordeuse de la grappe
Généralisation du second vol de cochylis

Stades

Les températures élevées que nous connaissons ont permis une évolution rapide de la végétation.
Actuellement, les vignes se situent dans un grand nombre de cas au stade **31** ("baies à taille de pois, les grappes pendent"). Le stade **33** ("fermeture de la grappe") commence à être atteint dans les situations les plus avancées.

Black rot

Dans plusieurs parcelles, des symptômes sont observés sur feuilles.

Dans les parcelles concernées, maintenez une protection sans failles avec une spécialité anti-mildiou (et/ou anti-oïdium) autorisée pour cette usage.

Botrytis

Le stade "fermeture de la grappe" est atteint dans les situations précoces.
Dans les autres situations, il devrait être atteint dans les jours à venir.

Dans le cas d'une stratégie à trois traitements, la deuxième intervention doit être réalisée à ce stade.

Rappel : une stratégie à trois traitements ne sera mise en œuvre que dans les parcelles les plus sensibles à la pourriture.

Veillez à respecter la règle d'alternance des familles chimiques : voir bulletin n°10 du 31 mai dernier.

Dans la lutte contre cette maladie, n'oubliez pas la mise en œuvre des mesures prophylactiques.

Esca, B.D.A.

Dans tous les vignobles de la région, les premiers symptômes commencent à être observables.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

D.R.A.F. CENTRE
Service Régional de la Protection des Végétaux
93, rue de Curambourg
45404 Fleury les Aubrais
Tél. 02.38.22.11.11
Fax 02.38.84.19.79
SRPV.DRAF-CENTRE@agriculture.gouv.fr

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de la Région CENTRE
Le Directeur-Gérant : V. MORARD
Publication périodique
C.P.P.A.P. n° 01701 AD
ISSN n° 0757-4029

Diffusion en collaboration avec la FREDON CENTRE (Art. L 252-1 à L 252-5 du Code Rural)

Mildiou

La situation sanitaire n'a pas beaucoup évolué au cours de la semaine écoulée : peu de nouvelles taches sont observées dans les parcelles suivies.
Selon les calculs du modèle MILVIT, les précipitations à caractère orageux de la nuit dernière ont permis de nouvelles contaminations pour l'ensemble des postes suivis. Les taches correspondant devraient apparaître en toute fin de cette semaine.
Les vignes devaient être protégées avant le début de cette période pluvieuse, notamment dans les parcelles où la maladie est présente.

Surveillez l'évolution de l'état sanitaire des parcelles.

Dans celles où des symptômes sont observés, une protection soignée sera maintenue. Les traitements seront renouvelés en fin de persistance d'action des produits utilisés.

En situation parfaitement saine, la protection devra être mise en place avant les prochaines pluies annoncées par Météo France.

A ce stade, des spécialités de contact ou pénétrantes peuvent être utilisées.

Oïdium

La situation est le plus souvent saine. L'apparition de nouveaux symptômes est signalée à Amboise (37) sur feuilles et sur grappes.
Les conditions météorologiques que connaît actuellement la région sont très favorables à cette maladie.
Les grappes vont devenir moins sensibles à l'oïdium en arrivant au stade "fermeture de la grappe". Ce stade commence à être atteint dans les parcelles les plus précoces.

Veillez à maintenir la protection jusqu'à la fin de la période de sensibilité. Dans le choix des produits, tenez compte des nécessités d'intervention contre les autres maladies : black-rot, mildiou.

En culture biologique, intervenez avec du soufre sur feuillage parfaitement sec. Attention aux risques de brûlure par températures élevées.

Cicadelle verte

Les populations restent faibles dans les parcelles suivies.

Une intervention n'est pas justifiée pour le moment.

Maintenez la surveillance en observant la face inférieure des feuilles.

Tordeuses de la grappe

Tordeuses de la grappe

Source : http://www.inra.fr/hyp3/

Cochylis : papillon

Source : http://www.inra.fr/hyp3/ (Coutin R. / OPIE)

Eudémis : papillon

Les captures d'**eudémis** sont pour le moment très réduites dans le réseau de piégeage.

On assiste à une généralisation du second vol de **cochylis** : des papillons sont désormais capturés dans l'ensemble de la région. Un pic a été enregistré en début de semaine. Les conditions météorologiques enregistrées au cours des derniers jours (températures très élevées et hygrométrie faible) ont été peu favorables à l'activité de ponte. Très peu de dépôts d'oeufs ont été observés pour le moment.

Dans les parcelles justifiant une intervention, l'application des spécialités ovicides pourra être réalisée jusqu'à la fin de cette semaine.

Les spécialités à action larvicide préventive devraient pouvoir être utilisées dans le courant de la semaine prochaine : attendre le prochain bulletin.

Acariens rouges

Pour le moment, ce ravageur demeure discret dans les parcelles suivies.

Restez vigilants et surveillez régulièrement l'évolution des populations dans les parcelles sensibles.

Le seuil d'intervention est actuellement de 30 % des feuilles occupées par au moins une forme mobile.